"Solución integrable en ECE de información farmacológica en Español"

Base de conocimiento farmacológico y soporte a la

Decisión Clínica

Guía rápida de uso

Versión México

Vademecum | Hospital Data Solutions

Vademecum Data Solutions

Completo – Rápido – De confianza

Vademecum Data Solutions

Consulta y uso de funcionalidades



- CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA
- ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL
- BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS ACTIVAS
- BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS ACTIVAS / SELECCIÓN DE MEDICAMENTO (VMP)
- BÚSQUEDA DE MEDICAMENTOS
- AÑADIR UN MEDICAMENTO AL FORMULARIO
- SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ANÁLISIS DE PRESCRIPCIÓN
- ANÁLIS E IDONEIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN
- ACCESO A LOS ÍNDICES
- ENFERMEDADES INFECCIOSAS
- MÓDULO DE ESTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD DE MEDICAMENTOS INYECTABLES
- ACCESO CIE10 – AYUDA A LA CODIFICACIÓN
- MÓDULO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS

http://vds-mexico.vademecum.es/



Vademecum Data Solutions

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA



CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
Mis Favoritos
[Gestionar Favoritos]
Índice alfabético de Clases ATC
Listado de las clases ATC ordenadas alfabéticamente.
Índice alfabético de Grupos VMP
Listado de los grupos VMP ordenadas alfabéticamente.
Índice alfabético de Medicamentos
Información oficial completa de todos los medicamentos autorizados en España ordenados alfabéticamente por nombre del medicamento.
Medicamentos clasificados por código ATC
Medicamentos clasificados por grupos terapéuticos según su código ATC. Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química estructurado en forma de árbol para facilitar la búsqueda
Índice alfabético de Principios activos
Todos los principios activos y sales asociadas autorizados en España ordenados alfabéticamente y vinculados a los medicamentos autorizados
Principios activos clasificados por código ATC
Clasificación de los principios activos según su código ATC. Estructurada en forma de árbol para facilitar la búsqueda. Cada principio activo está vinculado a los medicamentos autorizados con dicha composición.
Opciones de busqueda
ATCs
Grupo VMP
Medicamentos
Principios Activos
Patologías
Empieza con
Contiene
Limitar al contenido de la Guía
Nivel de las interacciones
Interacciones más graves
Interacciones probablemente graves
Interacciones teóricas o anecdóticas
Interacciones controvertidas
Refrescar Pagina

Podemos personalizar las opciones del buscador

Podemos elegir el nivel de gravedad para mostrar las alertas cuando existan interacciones medicamentosas

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
Mis Favoritos
[Gestionar Favoritos]
Noticias
(Editar)
Podemos configurar las noticias de acuerdo con los canales twitter que queramos, para ello hacemos clic en editar y posteriormente insertamos el canal
Canales definidos: cofepris,vades,ssalud_mx,ispch
Añadir un o mas canales tweeter (separados por una coma)
0 = reiniciar la lista
cofepris,vades,ssalud_mx,ispch
Aceptar
Cancelar
about 21 hours ago Expertos de todo el mundo presentarán en Valencia los últimos avances en neurorrehabilitación. http://t.co/XDDvuLHMOV
about 21 hours ago Profesionales editan el I Manual de Patología Médica y Embarazo en lengua española. http://t.co/WklvQYphpc
about 3 days ago Los invitamos a que escuchen la entrevista realizada por @lopezdoriga a la Secretaria de Salud @_MJuan_ http://t.co/acYLGtMiKf
about 3 days ago Protejamos contra el tétanos neonatal a mujeres embarazadas mediante la administración de una dosis de Tétanos Difteria. #SemanaDeSalud
about 3 days ago Sanidad anuncia la elaboración de un Mapa de Recursos sobre enfermedades raras. http://t.co/TfSLZSE161
Medicamentos clasificados por código ATC
Medicamentos clasificados por grupos terapéuticos según su código ATC. Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química estructurado en forma de árbol para facilitar la búsqueda
Índice alfabético de Principios activos
Todos los principios activos y sales asociadas autorizados en España ordenados alfabéticamente y vinculados a los medicamentos autorizados
Principios activos clasificados por código ATC
Clasificación de los principios activos según su código ATC. Estructurada en forma de árbol para facilitar la búsqueda. Cada principio activo está vinculado a los medicamentos autorizados con dicha composición.

ACCESO AL MENÚ DE FUNCIONALIDADES



Pulsando Menú podemos acceder a cada uno de los contenidos de Vademecum Data Solutions

(Índices, Medicamentos Extranjeros, Patologías, Video demostrativo, Guía Rápida de uso, Formulario terapéutico)

ACCESO A LA CASILLA DE BÚSQUEDA GENERAL

Inicio
Menu
paracetamol
Buscar
Análisis prescripción
Mis Favoritos
[Gestionar Favoritos]
Índice alfabético de Clases ATC
Listado de las clases ATC ordenadas alfabéticamente.
Índice alfabético de Grupos VMP
Listado de los grupos VMP ordenadas alfabéticamente.
Índice alfabético de Medicamentos
Información oficial completa de todos los medicamentos autorizados en España ordenados alfabéticamente por nombre del medicamento.
Medicamentos clasificados por código ATC
Medicamentos clasificados por grupos terapéuticos según su código ATC. Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química estructurado en forma de árbol para facilitar la búsqueda
Índice alfabético de Principios activos
Todos los principios activos y sales asociadas autorizados en España ordenados alfabéticamente y vinculados a los medicamentos autorizados
Principios activos clasificados por código ATC
Clasificación de los principios activos según su código ATC. Estructurada en forma de árbol para facilitar la búsqueda. Cada principio activo está vinculado a los medicamentos autorizados con dicha composición.
Índice alfabético de Enfermedades
Listado de enfermedades según codificación clínica CIE9 ordenadas alfabéticamente y vinculadas a los medicamentos autorizados para su tratamiento.
Ayuda a la codificación: CIE10
Búsqueda del código o de los términos redactados en la codificación clínica CIE10.
Medicamentos extranjeros
Incluye el listado de medicamentos y sus equivalentes en 28 países. Ayuda en la sustitución de un medicamento extranjero por su equivalente en España u otro país.
Mostrar medicamentos de la
Realizar backup Guía
Restaurar backup Guía

Introducir el término a buscar

Ejemplo: buscamos“PARACETAMOL”

Siempre debemos introducir únicamente la sustancia activa (sin dosis ni forma farmacéutica)


Noticias
(Editar)
about 20 hours ago Expertos de todo el mundo presentarán en Valencia los últimos avances en neurorrehabilitación. http://t.co/XDDvuLHMOV
about 3 days ago @lavillafuerte23 Si su bebé tiene todas sus vacunas es conveniente que reciba solo la Sabin. El resto no tiene que aplicarse nuevamente
about 3 days ago Los invitamos a que escuchen la entrevista realizada por @lopezdoriga a la Secretaria de Salud @_MJuan_ http://t.co/acYLGtMiKf
about 3 days ago Protejamos contra el tétanos neonatal a mujeres embarazadas mediante la administración de una dosis de Tétanos Difteria. #SemanaDeSalud
about 3 days ago Sanidad anuncia la elaboración de un Mapa de Recursos sobre enfermedades raras. http://t.co/TfSLZSE161
about 3 days ago Alteraciones genéticas de ciertos tumores podrían ayudar a aumentar la respuesta individualizada a la radioterapia. http://t.co/1UIRVcw2aD
about 3 days ago Las farmacias de Madrid aplican ya un nuevo sistema informático para la dispensación. http://t.co/qfpbpVG3Nj
about 4 days ago Las gotitas de la #vacuna Sabin, protegen a tu bebé de la poliomielitis! Si tu hijo o hija son menores de cinco años solicitala!
about 4 days ago Farmacéuticos de Baleares evaluarán el riesgo de desnutrición en ancianos. http://t.co/PYnMtgjoIL
about 4 days ago Expertos reumatólogos profundizan en el diagnóstico por imagen de la Espondiloartritis. http://t.co/h6DHSuO8m4
about 4 days ago Los pacientes con psoriasis tienen trastornos psicosociales entre 3 y 5 veces más que la población general. http://t.co/uW81FNnFxD

ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL


Inicio
Menu
paracetamol
Buscar
Análisis prescripción
Tu búsqueda: "paracetamol" (97 resultados)
ATCs (13)
VMP (67)
Medicamentos (16)
Principios Activos (1)
Tu búsqueda por: ATC > "paracetamol" > ha generado 13 resultados
CARISOPRODOL + PARACETAMOL
ERGOTAMINA + CAFEÍNA + PARACETAMOL
METOCARBAMOL + PARACETAMOL
PARACETAMOL
PARACETAMOL + ÁC. ASCÓRBICO
PARACETAMOL + CAFEÍNA
PARACETAMOL + CODEÍNA
PARACETAMOL + DIMENHIDRINATO + CAFEÍNA
PARACETAMOL + ETENZAMIDA + CAFEÍNA
PARACETAMOL + PROPIFENAZONA + CAFEÍNA
página 1 de 1
Inicio
Menu
Diabetes
Buscar
Tu búsqueda: "Diabe" (40 resultados)
Patologías (33)
Medicamentos (7)
Tu búsqueda por: Patologías > "Diabe" > ha generado 33 resultados
Coma hiperosmolar del diabético
Diabetes con alto riesgo cardiovascular, tratamiento preventivo de las complicaciones
Diabetes insípida
Diabetes insípida por carencia de hormona antidiurética
Diabetes insulinodependiente
Diabetes insulinodependiente en el sujeto > 2 años
Diabetes insulinodependiente, tratamiento asociado de segunda línea (de la)
Diabetes insulinodependiente, tratamiento complementario (de la)
Diabetes insulino-requirente
Diabetes insulino-requirente en el adulto, tratamiento complementario (de la)
Diabetes insulino-requirente en el niño > 10 años, tratamiento complementario (de la)
Diabetes insulino-requirente en el sujeto > 2 años
Diabetes no insulinodependiente

Nos aparecen los resultados por pestañas:

- **ATCs**
- **VMP**
- **Medicamentos**
- **Principios Activos**
- **Patologías**

Podemos introducir en el buscador, tanto medicamentos, sustancias activas y patologías. Los resultados de búsqueda disponibles se presentan por pestañas

BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS ACTIVAS – Ejemplo PARACETAMOL



Resultados de búsqueda de ATCs que incluyen Paracetamol

Si pulsamos en el ATC nos despliega la Monografía con información clínica de la sustancia activa


PARACETAMOL (N02BE01)
SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS
Mecanismo de acción
Indicaciones terapéuticas
Posología
Intervalo mín. entre dosis, 4 h. I.R. grave: mín. intervalo entre dosis, 6 h.
Modo de administración:
Contraindicaciones
Hipersensibilidad. Insuficiencia hepatocelular grave.
Advertencias y precauciones
paracetamol * 1 g ; vía oral ; comprimido
paracetamol * 1 g ; vía oral ; comprimido efervescente
paracetamol * 1 g ; vía oral ; granulado efervescente
paracetamol * 1 g ; vía oral ; polvo para solución oral
paracetamol * 1 g ; vía oral ; solución oral
paracetamol * 10 mg/ml ; vía parenteral ; solución para perfusión
paracetamol * 100 mg ; vía rectal ; supositorio
paracetamol * 100 mg/ml ; vía oral ; solución oral
paracetamol * 120 mg/5 ml ; vía oral ; jarabe

BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS ACTIVAS – Ejemplo PARACETAMOL


Inicio
Menu
paracetamol
Buscar
Análisis prescripción
Tu búsqueda: "paracetamol" (97 resultados)
ATCs (13)
VMP (67)
Medicamentos (16)
Principios Activos (1)
Tu búsqueda por: VMP > "paracetamol" > ha generado 67 resultados
ácido acetilsalicílico * 250 mg + cafeína * 65 mg + paracetamol * 250 mg ; vía oral ; comprimido
- ACETILSALICÍLICO ÁCIDO, ASOCIACIONES EXCL. PSICOLÉPTICOS
ácido acetilsalicílico * 250 mg + paracetamol * 250 mg ; vía oral ; comprimido
ácido acetilsalicílico * 267 mg + cafeína * 40 mg + paracetamol * 133 mg ; vía oral ; comprimido efervescente
ácido ascórbico * 200 mg + paracetamol * 330 mg ; vía oral ; comprimido efer
cafeína * 100 mg + ergotamina tartrato * 1 mg + paracetamol * 300 mg ; vía
cafeína * 100 mg + ergotamina tartrato * 2 mg + paracetamol * 400 mg ; vía
cafeína * 25 mg + clorfenamina maleato * 4 mg + paracetamol * 650 mg ; vía
cafeína * 25 mg + clorfenamina maleato * 4 mg + paracetamol * 650 mg ; vía
cafeína * 30 mg + codeína fosfato * 10 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; comprimido
cafeína * 50 mg + paracetamol * 250 mg + propifenazona * 150 mg ; vía oral ; comprimido
cafeína * 50 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; comprimido
- ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS
- PARACETAMOL + CAFEÍNA
cafeína * 65 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; comprimido
- PARACETAMOL + CAFEÍNA
clorfenamina maleato * 2 mg + paracetamol * 500 mg + pseudoefedrina clorhi
clorfenamina maleato * 2 mg + paracetamol * 500 mg + pseudoefedrina clorhi
clorfenamina maleato * 4 mg + paracetamol * 1 g + fenilefrina clorhidrato * 10 mg ; vía oral ; polvo para solución oral
clorfenamina maleato * 4 mg + paracetamol * 650 mg + fenilefrina clorhidrato * 10 mg ; vía oral ; polvo para solución oral
clorfenamina maleato * 4 mg + paracetamol * 650 mg + fenilefrina clorhidrato * 10 mg ; vía oral ; polvo para suspensión oral
codeína (fosfato) * 15 mg + paracetamol * 325 mg ; vía oral ; comprimido
codeína (fosfato) * 30 mg + paracetamol * 650 mg ; vía oral ; comprimido
codeína fosfato * 10 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; comprimido
codeína fosfato * 30 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; cápsula dura
- CODEÍNA, ASOCIACIONES
codeína fosfato * 30 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; comprimido
codeína fosfato * 30 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; comprimido efervescente
difenhidramina clorhidrato * 25 mg + paracetamol * 500 mg ; vía oral ; comprimido
orfenadrina citrato * 35 mg + paracetamol * 450 mg ; vía oral ; comprimido
- ORFENADRINA (CITRATO)
- ORFENADRINA, ASOCIACIONES
paracetamol * 1 g ; vía oral ; comprimido
- PARACETAMOL
paracetamol * 1 g ; vía oral ; comprimido efervescente
paracetamol * 1 g ; vía oral ; granulado efervescente
paracetamol * 1 g ; vía oral ; polvo para solución oral

1. Abrimos la pestaña VMP y buscamos la sustancia activa en la lista desplegada

2. Resultados de búsqueda de VMP* que incluyen Paracetamol

3. Hacemos clic en la sustancia activa correspondiente

***VMP:** Se trata de un concepto farmacéutico que nos permite codificar los medicamentos al nivel de [Sustancia Activa+dosis+vía+forma] para el aseguramiento terapéutico y la integración con software clínicos

Vademecum Data Solutions

Completo – Rápido – De confianza

Vademecum Data Solutions

BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS ACTIVAS / SELECCIÓN DE MEDICAMENTO (VMP)

Monografía de la Sustancia Activa

Posología

- Oral: ads. ... sde 0 meses: 15 mg/kg/6 h o 10 mg/kg/4 h. ... Ancianos, reducir dosis en un 25%.
- Rectal: lactantes de: 10 kg, 150 mg/6h, máx. 750 mg/día; 13-18 kg, 150 mg/4-6 h, máx. 900mg/día; 20 kg, 150-300 mg/4-6 h, máx. 1.200 mg/día. Niños de: 12-16 kg, 300-325 mg/8h, máx. 1g/día; 17-23 kg, 300-325 mg/6 h, máx. 1.5g/día; 24-40 kg, 300-325 mg/4-6 h, máx. 2.5g/día. Ads. y adolescentes: 600-1.300 mg/6h, máx. 5g/día.
- IV (perfus. de 15 min): dosis según peso del paciente:

Intervalo mín. entre dosis, 4 h. I.R. grave: mín. intervalo entre dosis, 6 h.

Modo de administración:

Comprimido bucodispersable: deshacer en la boca antes de ser tragado.
Granulado efervescente: disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el burbujeo.
Solución oral: puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente.
Polvo para solución oral: tomar disuelto en agua.
Granulado para solución oral: disolver en 1/2 vaso de agua fría y tomar inmediatamente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad. Insuficiencia hepatocelular grave.

Advertencias y precauciones

Alcohólicos o en caso de I.H.: no sobrepasar 2 g paracetamol/día. Niños < 3 años. Asmáticos sensibles a ... (reacción cruzada). Evitar uso prolongado en anemia, afección cardiaca o pulmonar e I.R. grave. Riesgo de ... grave con dosis altas. Vía IV, precaución en malnutrición crónica y deshidratación.

Añade el medicamento para el análisis de la prescripción



- paracetamol * 1 g ; vía oral ; polvo para solución oral
- paracetamol * 1 g ; vía oral ; solución oral
- paracetamol * 10 mg/ml ; vía parenteral ; solución para perfusión
- paracetamol * 100 mg ; vía rectal ; supositorio
- paracetamol * 100 mg/ml ; vía oral ; solución oral
- paracetamol * 120 mg/5 ml ; vía oral ; jarabe

En la parte derecha se listan todas las opciones de VMP* y deberá seleccionar la que se incluye en sus catálogo

Haciendo clic en la carpeta azul, accedemos al mini formulario de alta en el Catalogo del Hospital. En la casilla Código Centro añadimos Código Interno del Catálogo correspondiente

***VMP:** Se trata de un concepto farmacéutico que nos permite codificar los medicamentos al nivel de [Sustancia Activa+dosis+vía+forma] para el aseguramiento terapéutico y la integración con software clínicos

Vademecum Data Solutions

BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS ACTIVAS – SELECCIÓN DE MEDICAMENTO (VMP)


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
serge winther
PARACETAMOL (N02BE01)
Ver listado de abreviaturas
SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS
Mecanismo de acción
Si hacemos clic, se despliega la monografía del VMP, donde se muestra la información del medicamento así como las marcas asociados a este
paracetamol * 1 g ; vía oral ; comprimido
paracetamol * 1 g ; vía oral ; comprimido efervescente
paracetamol * 1 g ; vía oral ; granulado efervescente
paracetamol * 1 g ; vía oral ; polvo para solución oral
paracetamol * 1 g ; vía oral ; solución oral
paracetamol * 10 mg/ml ; vía parenteral ; solución para perfusión
25%.
- Rectal: lactantes de: 10 kg, 150 mg/6h, máx. 750 mg/día; 13-18 kg, 150 mg/4-6 h, máx. 900mg/día; 20 kg, 150-300 mg/4-6 h, máx. 1.200 mg/día. Niños de: 12-16 kg, 300-325 mg/8h, máx. 1g/día; 17-23 kg, 300-325 mg/6 h, máx. 1.5g/día; 24-40 kg, 300-325 mg/4-6 h, máx. 2.5g/día. Ads. y adolescentes: 600-1.300 mg/6h, máx. 5g/día.
- IV (perfus. de 15 min): dosis según peso del paciente:
Intervalo mín. entre dosis, 4 h. I.R. grave: mín. intervalo entre dosis, 6 h.
Modo de administración:
Comprimido bucodispersable: deshacer en la boca antes de ser tragado.
Granulado efervescente: disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el burbujeo.
Solución oral: puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente.
Polvo para solución oral: tomar disuelto en agua.
Granulado para solución oral: disolver en 1/2 vaso de agua fría y tomar inmediatamente.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad. Insuficiencia hepatocelular grave. Hepatitis vírica.
Advertencias y precauciones
Alcohólicos o en caso de I.H.: no sobrepasar 2 g paracetamol/día. Niños < 3 años. Asmáticos sensibles al AAS (reacción cruzada). Evitar uso prolongado en anemia, afección cardiaca o pulmonar e I.R. grave. Riesgo de daño hepático grave con dosis altas. Vía IV, precaución en malnutrición crónica y deshidratación.
Insuficiencia hepática
PARACETAMOL (N02BE01)
Composicion
paracetamol 10.00000 mg/ml
Medicamentos
TEMPRA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 g/100 ml (BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.)
TEMPRA SOLUCIÓN INYECTABLE 500 mg/50 ml (BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.)
Interacciones
Ver interacciones
Indicaciones
También es posible añadir medicamentos en el Catálogo, haciendo clic en la carpeta azul para gestionarlos como marcas comerciales

BÚSQUEDA DE MEDICAMENTOS


Inicio
Menu
paracetamol
Buscar
Análisis prescripción
Tu búsqueda: "paracetamol" (97 resultados)
ATCs (13)
VMP (67)
Medicamentos (16)
Principios Activos (1)
Tu búsqueda por: Medicamentos > "paracetamol" > ha generado 16 resultados
Fisiologico 1000ml + Tempra (paracetamol) 1g
Fisiologico 250ml + Tempra (paracetamol) 1g
Fisiologico 250ml + Tempra (paracetamol) 1g + Pantozol(Pantoprazol) 40mg + Zofr
NAPROXENO/PARACETAMOL LANDS TABS 275/300 mg
NAPROXENO/PARACETAMOL MEDIC NAL TABS 275/300 mg
NAPROXENO/PARACETAMOL SERRAL
PARACETAMOL IQFA SOL
PARACETAMOL KENDRICK 500 mg
PARACETAMOL MEDIC NAL TABS 750 mg
PARACETAMOL MEDIC NAL SOL 100 mg
PARACETAMOL MEDIC NAL SOL 3.2 g
PARACETAMOL SERRAL TABS 500 mg
PARACETAMOL SERRAL TABS 750 mg
PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 mg/ml
PARACETAMOL SUPOSITORIOS 300 mg
PARACETAMOL TABLETAS 500 mg

Resultados de búsqueda de Medicamentos que incluyen Paracetamol

Si pulsamos en el Medicamento nos despliega de la Monografía la sustancia activa


PARACETAMOL (N02BE01)
SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS
Mecanismo de acción
Analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.
Indicaciones terapéuticas
- Oral o rectal: fiebre; dolor de cualquier etiología de intensidad leve o moderado.
- IV: dolor moderado y fiebre, a corto plazo, cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías.
Posología
- Oral: ads.: 1g/6-8 h o ads. y niños > 12 años: 500-650 mg/4-6 h; máx. 4 g/día. Niños desde 0 meses: 15 mg/kg/6 h o 10 mg/kg/4 h. I.R.: Clcr < 10 ml/min: intervalo mín. entre tomas, 8 h; Clcr 10-15 ml/min, 6 h. Ancianos, reducir dosis en un 25%.
- Rectal. lactantes de: 10 kg, 150 mg/6h, máx. 750 mg/día, 13-18 kg, 150 mg/4-6 h, máx. 900mg/día; 20 kg, 150-300 mg/4-6 h, máx. 1.200 mg/día. Niños de: 12-16 kg, 300-326 mg/8h, máx. 1g/día; 17-23 kg, 300-326 mg/6 h, máx. 1.6g/día; 24-40 kg, 300-325 mg/4-6 h, máx. 2.5g/día. Ads. y adolescentes: 600-1.300 mg/6h, máx. 5g/día.
- IV (perfus. de 15 min): dosis según peso del paciente:
Intervalo mín. entre dosis, 4 h. I.R. grave: mín. intervalo entre dosis, 6 h.
Modo de administración:
Comprimido bucodispersable: deshacer en la boca antes de ser tragado.
Granulado efervescente: disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el burbujeo.
Solución oral: puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente.
Polvo para solución oral: tomar disuelto en agua.
Granulado para solución oral: disolver en 1/2 vaso de agua fría y tomar inmediatamente.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad. Insuficiencia hepatocelular grave.
Advertencias y precauciones
paracetamol ~ 1 g ; vía oral ; comprimido
paracetamol ~ 1 g ; vía oral ; comprimido efervescente
paracetamol ~ 1 g ; vía oral ; granulado efervescente
paracetamol ~ 1 g ; vía oral ; polvo para solución oral
paracetamol ~ 1 g ; vía oral ; solución oral
paracetamol ~ 10 mg/ml ; vía parenteral ; solución para perfusión
paracetamol ~ 100 mg ; vía rectal ; supositorio
paracetamol ~ 100 mg/ml ; vía oral ; solución oral
paracetamol ~ 120 mg/5 ml ; vía oral ; jarabe

BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS ACTIVAS – Ejemplo PARACETAMOL



Si pulsamos en la pestaña Principio Activo nos despliega también la información clínica de la sustancia activa

La Monografía contiene información sobre:

- Clasificación ATC
- Mecanismo de acción
- Indicaciones terapéuticas
- Posología (Dosis)
- Contraindicaciones
- Advertencias y precauciones
- Insuficiencia renal
- Interacciones
- Embarazo
- Lactancia
- Reacciones adversas


PARACETAMOL (N02BE01)
SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS
Mecanismo de acción
Indicaciones terapéuticas
Posología
Modo de administración:
Contraindicaciones
Advertencias y precauciones
paracetamol ˜ 1 g ; vía oral ; comprimido
paracetamol ˜ 1 g ; vía oral ; comprimido efervescente
paracetamol ˜ 1 g ; vía oral ; granulado efervescente
paracetamol ˜ 1 g ; vía oral ; polvo para solución oral
paracetamol ˜ 1 g ; vía oral ; solución oral
paracetamol ˜ 10 mg/ml ; vía parenteral ; solución para perfusión
paracetamol ˜ 100 mg ; vía rectal ; supositorio
paracetamol ˜ 100 mg/ml ; vía oral ; solución oral
paracetamol ˜ 120 mg/5 ml ; vía oral ; jarabe

AÑADIR UN MEDICAMENTO AL FORMULARIO



1. Introducimos sustancias activa por ejemplo: NISTATINA en la casilla de búsqueda general

2. Buscamos la composición correspondiente

3. Seleccionamos la carpeta azul para dar de alta el medicamento en CATÁLOGO

AÑADIR UN MEDICAMENTO AL FORMULARIO

Formulario de alta en el Catalogo del Hospital.



Debemos incorporar Código Interno del Catálogo en el apartado Código de Centro

Guardar y proceder con el siguiente MEDICAMENTO

SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ANÁLISIS DE PRESCRIPCIÓN


Posología
- Oral: ads.: 1g/6-8 h o ads. y niños > 12 años: 500-650 mg/4-6 h; máx. 4 g/día. Niños desde 0 meses: 15 mg/kg/6 h o 10 mg/kg/4 h. I.R.: Clcr < 10 ml/min: intervalo mín. entre tomas, 8 h; Clcr 10-15 ml/min, 6 h. Ancianos, reducir dosis en un 25%.
- Rectal: lactantes de: 10 kg, 150 mg/6h, máx. 750 mg/día; 13-18 kg, 150 mg/4-6 h, máx. 900mg/día; 20 kg, 150-300 mg/4-6 h, máx. 1.200 mg/día. Niños de: 12-16 kg, 300-325 mg/8h, máx. 1g/día; 17-23 kg, 300-325 mg/6 h, máx. 1.5g/día; 24-40 kg, 300-325 mg/4-6 h, máx. 2.5g/día. Ads. y adolescentes: 600-1.300 mg/6h, máx. 5g/día.
- IV (perfus. de 15 min): dosis según peso del paciente:
Intervalo mín. entre dosis, 4 h. I.R. grave: mín. intervalo entre dosis, 6 h.
Modo de administración:
Comprimido bucodispersable: deshacer en la boca antes de ser tragado.
Granulado efervescente: disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el burbujeo.
Solución oral: puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente.
Polvo para solución oral: tomar disuelto en agua.
Granulado para solución oral: disolver en 1/2 vaso de agua fría y tomar inmediatamente.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad. Insuficiencia hepatocelular grave.
Advertencias y precauciones
Alcohólicos o en caso de I.H.: no sobrepasar 2 g para
(reacción cruzada). Evitar uso prolongado en anemia,
grave con dosis altas. Vía IV, precaución en malnutrición crónica y deshidratación.
paracetamol * 1 g ; vía oral ; granulado efervescente
paracetamol * 1 g ; vía oral ; polvo para solución oral
1. Hacemos clic para añadir el medicamento para la prescripción.
perfusión
paracetamol * 100 mg ; vía rectal ; supositorio
l ; vía oral ; solución oral
ml ; vía oral ; jarabe
paracetamol * 125 mg ; vía rectal ; supositorio
2. En la barra superior de la página nos indica que se ha añadido un medicamento para el análisis de la prescripción
Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción : 2 medicamentos
PARACETAMOL (N02BE01) B
SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS
Mecanismo de acción
Analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.
paracetamol * 1 g ; vía oral ; comprimido

Vademecum Data Solutions

Completo – Rápido – De confianza

Vademecum Data Solutions

ANÁLIS E IDONEIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción : 5 medicamentos
serge winther
Medicamentos seleccionados
warfarina sodica * 5 mg ; via oral ; comprimido
metamizol sodico * 500 mg/ml + escopolamina butilbromuro * 4 mg/ml ; via parenteral ; solucion inyectable
omeprazol * 40 mg ; via oral ; capsula dura gastrorresistente
digoxina * 0,25 mg ; via oral ; comprimido
amoxicilina (sodica) * 1 g ; via parenteral ; polvo para solucion inyectable
Reiniciar
Perfil Paciente
sexo: Varón
edad:56 años
Perfil Paciente
sexo
Añadir Alergias
hipersensibilidad a las penicilinas
Reinicia
1. Una vez añadidas los medicamentos pulsamos en Análisis prescripción
2. Configuramos el perfil fisiopatológico
3. Añadimos las alergias y patologías CIE10
Personalización del Perfil del Paciente
Interacciones medicamentosas
Interacciones por clases de interacción
omeprazol * 40 mg ; vía oral ; cápsula dura gastrorresistente Omeprazol [Sustituir] - digoxina * 0,25 mg ; vía oral ; comprimido Digoxina (vía sistémica) [Sustituir]
Aumento moderado de la digoxinemina por aumento de su absorción por el omeprazol.
metamizol sódico * 500 mg/ml + escopolamina butilbromuro * 4 mg/ml ; vía parenteral ; solución inyectable
- Medicamentos nuevos: no se ha podido estudiar el conjunto de los IAM
Interacciones de los medicamentos añadidos
(podemos pulsar "sustituir" para eliminar la interacción)
Interacciones con alimentos
VMP
Interacción
warfarina sodica * 5 mg ; via oral ; comprimido
- Interacción con alimentos: alcohol
- Interacción con alimentos: alimentos ricos en vitamina K
omeprazol * 40 mg ; via oral ; capsula dura gastrorresistente
- Interacción con alimentos: no hay interacción con los productos lácteos
Alertas vinculadas al estado fisiopatológico del paciente
Nivel de alerta
Información
VMP
Molecula - CIE
Vía
Alergias - Hipersensibilidad a las penicilinas
Este medicamento contiene amoxicilina sódica. No debe administrarse a pacientes con Hipersensibilidad a las penicilinas.
amoxicilina (sódica) * 1 g ; vía parenteral ; polvo para solución inyectable
amoxicilina sódica
Edad - Precaución
Sujeto mayor de 5 años
omeprazol * 40 mg ; vía oral ; cápsula dura gastrorresistente
omeprazol
Vía oral
amoxicilina (sódica) * 1 g ; vía parenteral ; polvo para
Vía

Tenemos información de Alertas vinculadas al estado fisiopatológico del paciente

Vademecum Data Solutions

ANÁLIS E IDONEIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN



ANÁLIS E IDONEIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN

- Podemos guardar el perfil añadiéndole una descripción (se debe poner un código o descripción ya que no guardamos datos personales de acuerdo con la Ley de protección de datos)
- Podemos buscar los perfiles guardados por descripción o por un rango de fechas

ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Clases ATC


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
Índices
Enfermedades Infecciosas
CIE10 - Ayuda a la codificación
Medicamentos extranjeros
Formulario farmacoterapéutico VMP
Formulario farmacoterapéutico de Medicamentos
Ver video demostrativo
Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables
Manual de Instrucciones
Índice alfabético de Clases ATC
Índice alfabético de Grupos VMP
Medicamentos
Principios Activos
Índice alfabético de Enfermedades
Inicio
Menu
A
Buscar
Análisis prescripción
Elegir primera letra:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
Filtar por:
AB | AC | AD | AF | AG | AL | AM | AN | AP | AR | AS | AT | AU | AV

En la parte superior de los índices tenemos divididos los índices en orden alfabético. Además de la navegación alfabética (A-Z), podemos efectuar una búsqueda más precisa utilizando como filtro más de una letra

Búsqueda exhaustiva usando el filtro de más de una letra



ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Grupos VMP


Inicio
Menu
a
Buscar
Análisis prescripción
Elegir primera letra:
(| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
Filtar por:
AB | AC | AD | AG | AL | AM | AN | AP | AR | AS | AT | AU | AZ
abacavir (sulfato) * 20 mg/ml ; vía oral ; solución oral
- ABACAVIR
abacavir (sulfato) * 300 mg ; vía oral ; comprimido
- ABACAVIR
abacavir (sulfato) * 600 mg + lamivudina * 300 mg ; vía oral ; comprimido
- LAMIVUDINA Y ABACAVIR
abciximab * 2 mg/ml ; vía parenteral ; solución inyectable y para perfusión
- ABCIXIMAB
acamprosato cálcico * 333 mg ; vía oral ; comprimido gastrorresistente
acarbosa * 100 mg ; vía oral ; comprimido
acarbosa * 50 mg ; vía oral ; comprimido
- ACARBOSA
acebutolol (clorhidrato) * 200 mg ; vía oral ; comprimido
acebutolol (clorhidrato) * 400 mg ; vía oral ; comprimido
aceclofenaco * 1,5 % ; uso cutáneo ; crema
- ACECLOFENACO
aceclofenaco * 100 mg ; vía oral ; comprimido
- ACECLOFENACO
aceclofenaco * 100 mg ; vía oral ; polvo para suspensión oral
- ACECLOFENACO
aceclofenaco * 150 mg ; vía parenteral ; polvo y disolvente para solución inyectable
- ACECLOFENACO
aceite de ricino * 100 ml ; vía oral ; solución oral
aceite oliva * 160 mg/ml + aceite semilla soja * 40 mg/ml ; vía parenteral ; emulsión para perfusión

En la parte superior de los índices tenemos divididos los índices en orden alfabético. Además de la navegación alfabética (A-Z), podemos efectuar una búsqueda más precisa utilizando como filtro más de una letra

Búsqueda exhaustiva usando el filtro de más de una letra




Inicio
Menu
ab
Buscar
Elegir primera letra:
(| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
Filtar por:
ABA | ABC
abacavir (sulfato) * 20 mg/ml ; vía oral ; solución oral
- ABACAVIR
abacavir (sulfato) * 300 mg ; vía oral ; comprimido
- ABACAVIR
abacavir (sulfato) * 600 mg + lamivudina * 300 mg ; vía oral ; comprimido
- LAMIVUDINA Y ABACAVIR
abciximab * 2 mg/ml ; vía parenteral ; solución inyectable y para perfusión
- ABCIXIMAB

ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Medicamentos


Inicio
Menu
A
Buscar
Análisis prescripción
Elegir primera letra:
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
Filtar por:
A | A- | A. | A+ | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AK | AL | AM | AN | AP
A GRIN CAPSULAS 50000 UI
A.F. VALDECASAS SOLUCION 20 mg/100 ml
A.F. VALDECASAS SOLUCION 40 mg/100 ml
A.F. VALDECASAS TABLETAS 0,4 mg
A.F. VALDECASAS TABLETAS 4 mg
A.F. VALDECASAS TABLETAS 5 mg
A.S. COR SOLUCION GOTAS 10 mg/ml
A+D CREMA 10 %
AA-MIX 1 SOLUCION INYECTABLE
AA-MIX 2 SOLUCION INYECTABLE
AA-MIX 3 SOLUCION INYECTABLE
AA-VEN 10%
AA-VEN 15%
AA-VEN 5%
ABATOARIN CAPSULAS 5 mg
ABEFEN SOLUCION INYECTABLE 1 g/5 ml
ABELCET SUSPENSION INYECTABLE 100 mg/20 ml
ABELCET SUSPENSION INYECTABLE 50 mg/10 ml
ABESOR SUSPENSION
ABILIFY TABLETAS 10 mg
ABILIFY TABLETAS 15 mg
ABILIFY TABLETAS 20 mg
ABILIFY TABLETAS 30 mg
ABINIFIN TABLETAS 250 mg
ABKI GRAGEAS 400 mg
ABRIXONE TABLETAS 500 mg
ABSIT SUSPENSION
ACACIN CAPSULAS 500 mg
ACACIN SUSPENSION 250 mg/5 ml
ACANOL TABLETAS 2 mg

En la parte superior de los índices tenemos divididos los índices en orden alfabético. Además de la navegación alfabética (A-Z), podemos efectuar una búsqueda más precisa utilizando como filtro más de una letra

Búsqueda exhaustiva usando el filtro de más de una letra




Inicio
Menu
ac
Elegir primera letra:
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | A | B | C | D | E | F
Filtar por:
AC- | ACA | ACC | ACE | ACI | ACL | ACN
ACACIN CAPSULAS 500 mg
ACACIN SUSPENSION 250 mg/5 ml
ACANOL TABLETAS 2 mg
ACARBIXIN SUSPENSION 125 mg/31,25 mg/5 ml
ACARBIXIN TABLETAS 500 mg/125 mg
ACARBOSA TABLETAS 50 mg
ACAVEXAL TABLETAS 160 mg

ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Medicamentos clasificados por ATC



En el índice de medicamentos clasificados por código ATC encontramos el Árbol Farmacológico de Medicamentos. Podemos navegar por cada uno de los subniveles del árbol

ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Medicamentos clasificados por ATC


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
Arbol Farmacológico de Medicamentos
Haciendo clic llegamos a la Monografía de la Sustancia Activa
A02. Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos
A03. Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino
A04. Antieméticos y antinauseosos
A05. Terapia biliar y hepática
A06. Agentes contra el extreñimiento
A07. Antidiarreicos, antiinfecciosos y antiinflamatorios intestinales
A08. Preparados antiobesidad, excl. productos dietéticos
A09. Digestivos, incl. enzimas
A10. Antidiabéticos
A11. Vitaminas
A12. Suplementos minerales
A14. Agentes anabólicos para uso sistémico
A15. Estimulantes del apetito
A16. Otros productos para el tracto alimentario y metabolismo
B. Sangre y órganos hematopoyéticos
C. Sistema cardiovascular
D. Dermatológicos
G. Sistema genitourinario y hormonas sexuales
H. Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales
Medicamentos en esta clasificación
A - TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO
7-C CÁPSULAS
A GRIN CÁPSULAS 50000 UI
ABATOARIN CÁPSULAS 5 mg
ABRIXONE TABLETAS 500 mg
ACANOL TABLETAS 2 mg
ACARBOSA TABLETAS 50 mg
ACCOTAZ TABLETAS 15 mg
ACCOTAZ TABLETAS 30 mg
ACCOTAZ TABLETAS 45 mg
ACECOVYL SOLUCIÓN GOTAS
ACLOPEC CÁPSULAS 10 mg
ACLOPEC CÁPSULAS 20 mg
ACLOPEC CÁPSULAS 40 mg
ACLORAL B.I. SOLUCIÓN INYEC
50 mg/50 ml
ACLORAL SOLUCIÓN INYECTAB
mg/2 ml
ACLORAL TABLETAS 150 mg
ACLORAL TABLETAS 300 mg
ACOMPLIA TABLETAS 10 mg
ACOMPLIA TABLETAS 20 mg
ACON CÁPSULAS 50000 UI
ACQTA TABLETAS 2 mg
ACTICAL TABLETAS
ACTIKROLL TABLETAS
Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
RIMONABANT (A08AX01)
TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO > PREPARADOS ANTIOBESIDAD, EXCL. PRODUCTOS DIETÉTICOS > PREPARA
Mecanismo de acción
Antagonista selectivo del receptor cannabinoide-1, inhibe efectos farmacológicos de agonistas cannabinoides "in vitro" e "in vivo".
Indicaciones terapéuticas
Adyuvante de dieta y ejercicio para el tto. de pacientes obesos (IMC ≥ 30 kg/m 2), o con sobrepeso (IMC > 27 kg/m 2) con factores de riesgo asociados, como la diabetes tipo 2 o dislipemia.
Posología
Oral. Ads.: 20 mg/día (antes del desayuno).
Contraindicaciones
Hipersensibilidad, lactancia, depresión mayor y/o tto. antidepresivo en el momento actual.
Advertencias y precauciones
Epilepsia, I.H.e I.R. moderada, pacientes > 75 años y < 18 años, concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 (p. ej. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telitromicina, claritromicina, nefazodona). No iniciar el tto. en pacientes con ideación suicida en el momento actual y/o historia de ideación suicida y trastorno depresivo, enf. psiquiátrica no controlada, I.H. e I.R. grave. Se excluyeron de los estudios sujetos que sufrieron accidente cardiovascular (p. ej. infarto de miocardio, ictus) en los 6 meses previos.

ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Sustancias Activas



En la parte superior de los índices tenemos divididos los índices en orden alfabético. Además de la navegación alfabética (A-Z), podemos efectuar una búsqueda más precisa utilizando como filtro más de una letra

Búsqueda exhaustiva usando el filtro de más de una letra





ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Sustancias Activas por código ATC


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
Arbol Farmacológico ATC
A. Tracto alimentario y metabolismo
A01. Preparados estomatológicos
A06. Agentes contra el extreñimiento
A07. Antidiarreicos, antiinfecciosos y antiinflamatorios intestinales
A08. Preparados antiobesidad, excl. productos dietéticos
A09. Digestivos, incl. enzimas
A10. Antidiabéticos
A11. Vitaminas
A12. Suplementos minerales
A13. Tónicos
A14. Agentes anabólicos para uso sistémico
A15. Estimulantes del apetito
A16. Otros productos para el tracto alimentario y metabolismo
B. Sangre y órganos hematopoyéticos
C. Sistema cardiovascular
D. Dermatológicos
G. Sistema genitourinario y hormonas sexuales
H. Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales
J. Antiinfecciosos para uso sistémico
Haciendo clic llegamos a la Monografía de la Sustancia Activa
Principios activos en esta clasificación
A - TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO
A01. Preparados estomatológicos
A01A. Preparados estomatológicos
A01AA. Agentes para la profilaxis de las caries
A01AA01. Fluoruro de sodio
A01AA02. Monofluorofosfato de sodio
A01AA03. Olaflur
A01AA04. Fluoruro de estaño
A01AA30. Asociaciones
A01AA51. Fluoruro de sodio, asociaciones
A01AB. Antiinfecciosos y antisépticos para tratamiento oral-local
A01AB M1. Clorato potásico
A01AB M2. Povidona iodada
A01AB M3. Nistatina
A01AB P1. Antiinfecciosos, antisépticos para tratamiento oral local, asociaciones
A01AB P2. Anestésicos locales, asociaciones
A01AB P3. Nistatina + corticoides
A01AB P4. Perbo ascórbico ácido
A01AB02. Peróx
A01AB03. Clorhe
A01AB04. Amfot
A01AB05. Polino
A01AB06. Domif
A01AB07. Oxiqu
A01AB08. Neomi
A01AB09. Micon
A01AB10. Natam
A01AB11. Varios
A01AB12. Hexetidina
A01AB13. Tetraciclina
A01AB14. Benzoxonio cloruro
A01AB15. Tibezonio ioduro
A01AB16. Mepartricina
página 1 de 27
siguiente
HEXETIDINA (A01AB12)
TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO > PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS > PREPARAD
Indicaciones terapéuticas
Alivio sintomático de afecciones de la cavidad bucal (encías y paladar) que cursen con componente infeccioso. Halitosis. Alivio sintomático de las afecciones faríngeas.
Posología
Tópica oral. Ads. y niños > 6 años: lavados bucales o gargarismos: 15 ml durante 30 seg 2-3 veces/día; torunda: aplicar en zona afectada varios min.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad.
Advertencias y precauciones
Las aplicaciones frecuentes puede producir irritación y sequedad de mucosas.
Reacciones adversas
Infrecuente, alteraciones alérgicas.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS – Manejo de enfermedades infecciosas



Buscamos una Enfermedad o un Microorganismo, bien con el inicio de su denominación o con parte de lo que contiene



Instrucciones de uso y Autores de la información

ENFERMEDADES INFECCIOSAS – Manejo de enfermedades infecciosas



Nos aparecerá la lista de enfermedades coincidentes con los criterios de búsqueda



Podemos visualizar la información buscada. Si pulsamos en "Ver todo" veremos todo el contenido, o bien podemos visualizarlo por cada una de las secciones



Tratamiento

Circunstancias modificadoras	Tratamiento	Links a principios activos y marcas comerciales
VHA [Ver CIE9]	Tratamiento antiviral no recomendado Gammaglobulina 0,02 ml/kg IM, en las dos primeras semanas después de la exposición, protege del desarrollo de la infección. Misma protección que la vacuna del VHA (4).	Otros tratamientos / Comentarios: INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES, PARA ADMIN. EXTRAVASCULAR HEPATITIS A, VIRUS ENTERO INACTIVADO
VHB aguda [Ver CIE9]	Tratamiento antiviral no recomendado	
VHB crónica [Ver CIE9]	AgeHB+. Considerar tratamiento en: a) enfermos con elevación persistente de aminotransferasa b) niveles detectables de AgsHB en suero c) ADN-VHB, >105 copias/ml.	Tratamiento de elección: LAMIVUDINA

ENFERMEDADES INFECCIOSAS – Manejo de enfermedades infecciosas

Tratamiento

Circunstancias modificadoras	Tratamiento	Links a principios activos y marcas comerciales
VHA [Ver CIE9]	Tratamiento antiviral no recomendado Gammaglobulina 0,02 ml/kg IM, en las dos primeras semanas después de la exposición, protege de desarrollo de la infección. Misma protección que la vacuna del VHA (4).	Otros tratamientos / Comentarios: INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES, PARA ADMIN. EXTRAVASCULAR HEPATITIS A, VIRUS ENTERO INACTIVADO
VHB aguda [Ver CIE9]	Tratamiento antiviral no recomendado	
VHB crónica [Ver CIE9]	AgeHB+. Considerar tratamiento en: a) enfermos con elevación persistente de aminotransferasa b) niveles detectables de AgsHB en suero c) ADN-VHB, >105 copias/ml.	Tratamiento de elección: LAMIVUDINA

Circunstancias modificadoras

Tratamiento recomendado

Si pulsamos nos despliega la Monografía con información clínica de la sustancia activa

ENFERMEDADES INFECCIOSAS – Índice de enfermedades infecciosas





Se muestra el índice de enfermedades infecciosas. Podemos ver todo el listado o bien el índice dividido por categorías.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS – Índice de enfermedades infecciosas

Si pulsamos en una enfermedad podemos visualizar la información de esta.

Si pulsamos en "Ver todo" veremos todo el contenido, o bien podemos visualizarlo por cada una de las secciones



Pulsando en "Ver todas las enfermedades" se nos mostrará el listado de todas las enfermedades. Podemos navegar por las iniciales de las enfermedades



ENFERMEDADES INFECCIOSAS – Índice de Microorganismos y parásitos


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
[Gestionar Favoritos]
Índices
Enfermedades Infecciosas
CIE10 - Ayuda a la codificación
Medicamentos extranjeros
Formulario farmacoterapéutico VMP
Formulario farmacoterapéutico de Medicamentos
Ver video demostrativo
Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables
Manual de Instrucciones
Manejo de enfermedades infecciosas
Índice de Enfermedades Infecciosas
Índice de Microorganismos y parásitos
ATC. Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química estructurado en forma de árbol para facilitar la búsqueda
Principios activos clasificados por código ATC
Clasificación de los principios activos
Listado de enfermedades
compatibilidad de medicamentos inyectables
Ayuda a la codificación: CIE10
Búsqueda del código o de los



Se muestra el índice de Microorganismos y parásitos. Los podemos ver clasificados por el tipo de organismo o bien visualizar el listado completo

ENFERMEDADES INFECCIOSAS – Índice de Microorganismos y parásitos





Pulsando en cada uno de los tipos de microorganismos se visualiza el listado de estos



Si pulsamos en un microorganismo, podemos visualizar la información de este.

Si pulsamos en "Ver todo" veremos todo el contenido, o bien podemos visualizarlo por cada una de las secciones



Vacunación

En general la administración de la vacuna se establece a los 2, 4 y 6 meses, con dosis de recuerdo a los 15-18 meses y a los 4-6 años. El calendario de vacunación se establece de acuerdo a las disposiciones de cada comunidad autónoma.

Ver vacunas

Vacuna	Grupo Farmacológico
CARBOPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 mg	CARBOPLATINO
TRIZINET COMPRIMIDOS 10 mg	CETIRIZINA
TRIZINET SOLUCIÓN	CETIRIZINA

En vacunación podemos ver las vacunas disponibles para este microorganismo

Vademecum Data Solutions

Completo – Rápido – De confianza

Vademecum Data Solutions

Módulo de estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables



Esta opción nos llevará a la página web Stabilis donde se recoge toda la información sobre la estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables.

Manual de instrucciones propio incluido en el portal.

STABILIS
Última actualización : 20/11/2013
Buscar
Estabilidad y compatibilidad de los medicamentos
Bienvenido a Stabilis. Si desea recibir el boletín de noticias de forma trimestral, indique su dirección de correo electrónico
Boletín de noticias :
adresse@email.com
Para cualquier duda o sugerencia, se ruega contactar : stabilis@wanadoo.fr
INFOSTAB
Lista de la molécula
Listas recapitulativas
Búsqueda de incompatibilidades
Bibliografía
Autores
Manual de instrucciones
Boletín de noticias
Bases de datos
Bibliografía : 1699
Molécula : 635
Clase farmacológica : 39
Estabilidad de las soluciones : 3934
Estabilidad en mezcla : 890
Incompatibilidades : 2034
Nombre comercial : 1892
Novedades - Molécula
Minoxidil 07/10/2013
Clobazam 07/10/2013
Amphotericin B liposomale 28/09/2013
Levosimendan 18/08/2013
Romidepsin 18/08/2013
Tiapride 18/08/2013
Chloral hydrate 28/07/2013
Levofolinate disodium 20/05/2013
Novedades - Bibliografía
Fecha de entrada
3432 Istodax® (Romidepsin) Highlights of prescribing information Celgene Corporation 30/07/2013
3433 Stability of dexmedetomidine in polyvinyl chloride bags containing 0.9% sodium chloride injection. Am J Health-Syst Pharm 30/07/2013

STABILIS
Última actualización : 12/12/2013
Buscar
INFOSTAB
Lista de la molécula
Listas recapitulativas
Búsqueda de incompatibilidades
Bibliografía
Autores
Manual de instrucciones
Boletín de noticias
Manual de instruciones
What about STABILIS ?
1-How to use a monograph
2-How to obtain the list of drugs incompatible with various solvents ?
3-How to obtain the list of drugs which are stable in one type of container (ex : ethylenevinylacetate) ?
4-How to obtain the list of drugs which provokes the leaching of plasticizers. (or other factors affecting stability) ?
5-How to obtain the list of drugs administered by intramuscular route ? (or any other route of administration)
6-How to use the search function for incompatibilities ?
8-How to use the search function ?
7-How to use the references ?

Vademecum Data Solutions

ACCESO CIE10 – Ayuda a la codificación



Nos muestra el árbol de clasificación de patologías con codificación CIE10

MÓDULO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS



Nos muestra las Equivalencias internacionales



1. Ejemplo: buscamos “Adax”

2. Hacemos clic en el nombre comercial del medicamento, teniendo en cuenta la bandera de origen

Para utilizar este módulo debemos conocer el nombre comercial del medicamento y país donde está comercializado

MÓDULO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS



Si queremos ver las equivalencias específicas en México, desplegamos el menú y seleccionamos el país

MÓDULO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS


Inicio
Menu
Buscar...
Buscar
Análisis prescripción
Equivalencias internacionales:
Puedes utilizar el buscador de medicamentos con todas sus equivalencias:
buscar
429 equivalencias para: a acetilsalicilico diviser tablet 500 mg (España)
Mostrar medicamentos de todos los países
Forma
Vía
Clase ATC
AAS tablet 500 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
AAS tablet 500 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
AASEDANTIL tablet 100 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
AASEDANTIL tablet 500 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
AC ACETSALI powder for oral suspension 80% | Polvo para suspensión oral | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
AC ACSAL tablet 100 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
AC ACSAL tablet 300 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
AC ACSAL tablet 500 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
ACEKAPTON film-coated tablet 500 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
ACENTERINE film-coated tablet 500 mg | Acetilsalicílico ácido
Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
Comprimido recubierto con película | Vía oral | Acetilsalicílico ácido
Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido

Si pulsamos en un medicamento nos muestra sus equivalencias internacionales

Pulsando nos vuelve a mostrar el listado de países

En esta columna nos muestra la Sustancia activa del medicamento.

Pulsando en el nombre, nos muestra su posición en el árbol farmacológico ATC

Vademecum | Hospital Data Solutions

Descúbralo ya en su intranet

http://vds-mexico.vademecum.es

Contacte en

vademecumdata@vademecum.es